

CLAUDIO

ORIGINE: Sel.Cimmyt35/
Durango/IS1938/Grazia

CLAUDIO è una varietà di grande adattabilità e rusticità che la fanno diventare un investimento di sicuro successo in tutti gli areali di coltivazione del frumento duro sia in Italia che in Europa dove rappresenta la varietà emergente.

CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI


EPOCA DI SPIGATURA	MEDIA
TAGLIA	MEDIA
RESISTENZE	
FREDDO INVERNALE	MR
OIDIO	R-MR
RUGGINE BRUNA	MR
ALLETTAMENTO	MR

CARATTERISTICHE QUALITATIVE

PESO 1000 SEMI	45-50 GR
PESO ETTOLITRICO	ELEVATO
INDICE DI GIALLO	MEDIO
CONTENUTO PROTEICO	MEDIO ELEVATO
TENACITÀ DEL GLUTINE	ELEVATA

PUNTI DI FORZA

- LA VARIETÀ EMERGENTE IN TUTTA EUROPA
- PRODUTTIVITÀ AI MASSIMI LIVELLI
- ELEVATA E COSTANTE QUALITÀ



IRIDE

IRIDE

La varietà di grano duro Iride è la varietà più coltivata in Italia (da anni ai vertici delle classifiche risultanti dalle Prove Nazionali di grano duro, per produttività); è dotata di un'elevatissimo potenziale produttivo, determinato in particolare dalla eccezionale fertilità della spiga e dall'altissima adattabilità a differenti areali di produzione. La granella si caratterizza per l'elevato peso specifico e la buona attitudine alla trasformazione industriale. Iride presenta una buona resistenza a tutte le principali fitopatie.

CONSIGLI DEL COSTITUTORE

EPOCA DI SEMINA

Sono consigliate semine in epoca normale.

Indicativamente:

Centro-Nord Italia: terza decade di ottobre - seconda decade di novembre;

Centro Italia: seconda decade di novembre - prima decade di dicembre.

DENSITÀ DI SEMINA

La dose di semina consigliata è di 400-450 semi germinabili a m² in presenza di letti di semina adeguatamente preparati.

CONCIMAZIONE AZOTATA

Iride risponde molto bene ad appropriate concimazioni azotate, sia in termini quantitativi che qualitativi.

La dose di azoto da distribuire va ripartita in funzione delle condizioni in cui si opera, indicativamente:

1/4 di azoto alla semina o alla 3^a foglia; 2/4 fine accestimento - inizio levata; 1/4 al 2^o nodo - botticella.

In areali siccitosi:

1/4 di azoto alla semina o alla 3^a foglia; 3/4 fine accestimento - inizio levata.

In presenza di elevate precipitazioni, un ulteriore apporto di azoto deve essere previsto nella fase di botticella per migliorare il contenuto proteico.

DIFESA FITOSANITARIA

Iride non richiede trattamenti preventivi di difesa se non in presenza di condizioni particolarmente sfavorevoli allo sviluppo dei patogeni fungini.

CARATTERISTICHE VARIETALI

GENEALOGIA	ALTAR 84 / IONIO
ANNO D'ISCRIZIONE	1996
VERNALIZZAZIONE	ALTERNATIVO
EPOCA DI SPIGATURA	PRECOCE
ALTEZZA DELLA PIANTA	MEDIO-BASSA
PESO ETTOLITRICO	ELEVATO

CARATTERISTICHE QUALITATIVE

INDICE DI GIALLO	ELEVATO (B=22-24)
CONTENUTO PROTEICO	MEDIO-ALTO
QUALITÀ DEL GLUTINE	BUONA

RESISTENZA A:

OIDIO	BUONA
RUGGINE BRUNA	BUONA
FREDDO	BUONA



SOCIETÀ PRODUTTORI SEMENTI S.P.A. - BOLOGNA

